

**ORGANİK ÜRÜNLER**  
**Bitkisel Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre**  
**SUPERSOL DENGE**

Garanti Edilen İçerik	% W/W
Organik Madde	40
Organik Karbon	22
Organik Azot (N)	4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	4
Serbest Amino Asitler	6
pH	6-8

**ÜRETİCİ FİRMA**  
**SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.**  
**AHMEDİYE MAHALLESİ DAĞDIBİ SK. NO:68 ARİFİYE/SAKARYA**  
**TEL: 0 264 228 1837 FAKS: 0 232 799 03 56**  
**[www.supersol.com.tr](http://www.supersol.com.tr)**

**KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI**

Üretimde kullanılan ham maddeler organik kaynaklı olmasına rağmen tedbiren uygulama esnasında eldiven kullanınız. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde veya kullanımdan sonra bol su ile yıkayınız. Solumayınız, yutmayınız, yutulması halinde, doktora başvurunuz. Çocuklardan, gıdalardan uzak tutunuz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.

**DEPOLAMA KOŞULLARI**

Güneş almayan serin ve gölge ortamda +5° / 35° derece arasında 2 yıl depolama ömrü vardır.

**KARIŞABİLİRLİK**

Supersol Denge belirlenen dozajlarda tüm Supersol bitki besleme ürünleri ile karıştırabilir. Diğer ürünlerle uyumluluk testlerinin yaptırılması tavsiye edilir.

**FİRMA BEYANI**

Kullanıcı tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.



**Bakanlık Lisans No: 1249**

**Bakanlık Tescil No:**

**İmal tarihi:**

**Son kullanma tarihi:** Üretim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile özelliklerini korur.

**Ürün parti No:**

**Hacim:**

**Net Ağırlık:**

**Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

**Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

**SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.**  
**Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No: 68**  
**Arifiye/SAKARYA**  
**Gümrükönü V.D. 784 056 92 64**  
**Mersis No: 0784 0569 2640 0001**

Durmug DEMİREL  
Ticaret Yöneticisi

**SUPERSOL DENGE:**

Yapraktan, topraktan ve sulama suyuyla uygulanabilmektedir. Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (bünye) değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları gübre miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU	
		Yapraktan	Topraktan
Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan vb.)	Dikim ile birlikte 20 günde bir 3-4 uygulama, bitki gelişim dönemi boyunca.	250-300 cc/100 L su	1-2 lt/da
Tüm Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana vb.)	Dikim ile birlikte 20 günde bir 3-4 uygulama, bitki gelişim dönemi boyunca.	200-300 cc/100 L su	1 lt/da
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Kiraz, Şeftali, Kayısı vb.)	Taç yapraklar döküldüğünde. Meyve tutumu döneminde 15-20 günde bir uygulama.	200-300 cc/100 L su	1-2 lt/da
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Armut vb.)	Taç yaprakların dökümü başladığında. Meyve tutumu döneminde 15-20 günde bir uygulama.	200-300 cc/100 L su	2-3 lt/da
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep fıstığı, Ceviz, Fındık, Badem v.b.)	Meyve tutumu itibariyle 15 günde bir uygulama, sezonda 3 uygulama.	250-300 cc/100 L su	1-2 lt/da
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina vb.)	Vejetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda, 15 günde bir uygulama.	250-300 cc/100 L su	1-2 lt/da
Tropikal Meyveler (Muz, avokado, ejder meyvesi vb.)	Çiçeklenme sonrası, meyve olgunlaşma döneminde, 15 günde bir 3 uygulama.	250-350 cc/100 L su	2-3 lt/da

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok.No:68  
Arifiye/SAKARYA  
Gümrüközü V.D. 784 658 92 64  
Mersis No: 0784 0569 2640 0001

Dürmuş DEMİR  
www.arsel.com.tr

Bağ ve Zeytin	Çiçekler döküldüğünde, meyve oluşumunda.	250-300 cc/100 L su	1-2 lt/da
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Ş. Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç vb.)	Bitkilerin 5-6 yaprak olduğu dönemden itibaren, yumru irileşme dönemi boyunca.	250-500 cc/da	
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme döneminden itibaren.	250-500 cc/da	
Tarla Bitkileri (Pamuk, Mısır, Soya, Fasulye, vb.)	4-5 yaprak döneminden itibaren, sezonda 3 uygulama.	250-500 cc/da	
Yeşil Alan ve Kesme çiçek	Çıkıştan itibaren, vejetasyon süresi boyunca.	250-500 cc/da	

#### **TAAHHÜT**

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı Kanun'a göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**SUPERSOL BIYOTEKNOLOJİ A.Ş.**  
Arımediye Mah. Dağdibi Sok.No:68  
Arifiye/SAKARYA  
Gömrükönu V.D. 784 056 92 64  
Mersis No: 0784 0569 2640 0001

  
Durmuz Davut  
Şirket Müdürü