

ENZİM KATKILI ÜRÜN

ENZİMLİ ÜRÜN

FİTAZİM

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	%10
Enzim İsimleri	Fitaz Enzimi
Enzim Aktivitesi	0,270 FTU/g
pH	3.5-5.5

ÜRETİCİ FİRMA
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAHALLESİ DAĞDİBİ SK. NO:68 ARİFİYE/SAKARYA
TEL: 0 264 228 1837 FAKS: 0 232 799 03 56
www.supersol.com.tr

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Koyucu, maske, eldiven ve gözlük kullanınız. Ürünü solumayınız/teneffüs etmeyiniz. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde veya kullanımdan sonra bol su ile yıkayınız. Yutmayınız, yutulması halinde, doktora başvurunuz. Çocuklardan, gıdalardan uzak tutunuz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.

Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (BÜNYE) değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmaları tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Ürünü, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, +4°C / 45°C arasında depolayınız. Ürünü, ağız açık bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.



Bakanlık Lisans No: 1249

Bakanlık Tescil No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile özelliklerini korur.

Ürün Parti No:

Net Ağırlık: 0,25-0,5- 1-2,5-5-10-15-20-25-30-40 ' lik ambalajlarda

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No:68
Arifiye/SAKARYA
Gömrük No: V.D. 784 056 92 64
Tic. Sic. No: 0784 0569 2640 0001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU	
		TOPRAKTAN	YAPRAKTAN
Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan vb.)	1- Fide dikiminden 1 hafta sonra 2-İlk çiçeklenmede 3-İlk meyve dökümü sonrası	0,5-1 L/da	200-250 ml /100L su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana vb.)	1-Fide dikiminden 1 hafta sonra 2-İlk çiçeklenmede 3-İlk meyve dökümü sonrası	0,5-1 L/da	200-250 ml /100L su
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Ş. Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç vb.)	1- Gerçek yaprak oluşumundan sonra 2- Gelişme döneminde	0,5 L/da	200-250 ml /100L su
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Armut vb.)	1-Çiçeklenme başlangıcında 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3-Gelişme Döneminde	1 L/da	200-250 ml /100L su
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Kiraz, Şeftali, Kayısı vb.)	1-Çiçeklenme başlangıcında 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3- Gelişme Döneminde	1 L/da	200-250 ml /100L su
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina vb.)	1-Çiçeklenme öncesinde 2-Meyve tutumundan 15 gün sonra 3- Gelişme Döneminde	1-2 L/da	200-250 ml /100L su
Tropikal Meyveler (Muz, avakado, mango vb.)	1-Fide/Fidan Dikiminden Sonra 2-Çiçeklenme/Doğum Öncesi 3- Gelişme Döneminde	1 L/da	200-250 ml /100L su
Bağ ve Zeytin	1-Çiçeklenme öncesinde 2-Meyve tutumundan sonra 3-Gelişme Döneminde	1 L/da	200-250 ml /100L su
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Pamuk, Mısır, Soya, ÇeLİK vb.) ve Yeşil Alanlar	1-Bitki boyu 10-15 cm. olunca 2-Gelişim Döneminde	0,25-0,5 L/da	150-200 ml /100L su

TAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı Kanun'a göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No: 33
Arifiye/SAKARYA
Gümrükönu V.D. 784 056 92 84
Mersis No: 0784 0569 2640 0001



Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili