

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Hotei-K 5-0-30

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	:% W/W
Toplam Azotu (N)	5
Üre Azotu (N)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30

ÜRETİCİ FİRMA:
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAHALLESİ DAĞDIBİ SK. NO:5 ARİFİYE/SAKARYA
TEL: 0 264 228 1837 FAKS: 0 232 799 03 56
www.supersol.com.tr



UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0/40 °C arasındadır.

FİRMA BEYANI : Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları, uygun olmayan depolamalardan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiketi üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır. Ürün ambalajında verilmiş olan bilgiler, analizi ile sınırlı olup kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Talimat dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması önerilir. Ambalajlama ve paketleme firmanın kontrolü altındadır. Firma bilgisi ve izni olmadan ürünler değişik şekilde ambalajlanamaz ve paketlenemez.



Lisans No:
Tescil No:
Üretim Tarihi:
Parti No:
Son Kullanım Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Net Ağırlık:

İbrahim Tolga ULUŞAN
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAH. DAĞDIBİ SK.
NO: 5 ARİFİYE / SAKARYA
V.NO: 7840569264

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	TOPRAKTAN UYGULAMA (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera ve Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek, Marul, Pırasa vb.)	Meyve gelişim döneminden itibaren, 10-15 gün arayla, 2-3 uygulama.	1-2 L /da	150-200 ml/100 L su
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Kiraz, Şeftali, Kayısı vb.)	Meyve tutumundan itibaren, hasat öncesine kadar, 10-15 gün arayla, 3-4 uygulama.	1-2 L /da	200-250 ml/100 L su
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Armut vb.)	Meyve tutumundan itibaren, hasat öncesine kadar, 10-15 gün arayla, 3-4 uygulama.	1-2 L /da	200-250 ml/100 L su
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep fıstığı, Ceviz, Fındık, Badem vb.)	Meyve tutumundan itibaren, hasat öncesine kadar, 10-15 gün arayla, 3-4 uygulama.	1-2 L /da	200-250 ml/100 L su
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina vb.)	Meyve tutumundan itibaren, hasat öncesine kadar, 10-15 gün arayla, 3-4 uygulama.	1-2 L /da	200-250 ml/100 L su
Tropikal Meyveler (Muz, avakado, mango vb.)	Meyve büyümeye başladığından itibaren, 2-3 uygulama, 10-15 gün arayla.	1-2 L /da	150-200 ml/100 L su
Bağ ve Zeytin	Meyve oluşumundan hasada kadar.	1-2 L /da	150-200 ml/100 L su
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Pamuk, Mısır, Soya, Çeltik vb.) ve Yeşil Alanlar	Gelişme Döneminden başlayarak, hasat öncesine kadar, 10-15 gün arayla, 1-2 uygulama.	0,5-1 L /da	100-150 ml/100 L su
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç)	Ekim veya şaşırtmadan 5-6 hafta sonrası ile hasat arasında kalan dönemde, 1-2 uygulama	0,5-1 L /da	100-150 ml/100 L su

1 L =1,5 kg

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN
SUPERSOL-BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAHL. DAĞDİBİ SK.
NO: 5 ARİFİYE / SAKARYA
V.NO: 7840569264